*17º Congresso Brasileiro de Diabetes
2009*

Esteatose / Esteato-Hepatite
na Síndrome Metabólica,
Diabetes Mellitus/Obesidade

NORMAL

Fígado

Tecido adiposo

músculo

SNC

RINS

DM - 2

SM - DM

**ANORMALIDADES
METABÓLICAS**

Fígado

**DOENÇA
GORDUROSA**

DM Tipo 1

Doença Hepática Gordurosa Não Alcoólica

DEFINIÇÃO

DM2

- Lesão hepática indistinguível da causada pelo álcool
- Ausência de ingestão significativa de etanol (20g/dia), ou outras causas de doença hepática
- Seu conceito baseia-se em características:
 - clínicas (não alcoólica)
 - histológicas (esteatose/esteato-hepatite)
 - **5% -10%/peso -- macrovesicular

Doença Hepática Gordurosa Não Alcoólica

HISTÓRICO

- Associação ALTERAÇÕES HEPÁTICAS x DM 2

LEEVY CM. Fatty liver: a study of 270 patients with biopsy proven fatty liver and review of the literature. *Medicine (Baltimore)*. 1962 Sep;41:249-76.

OUTRAS DENOMINAÇÕES

- Fígado Gorduroso
- Hepatite Gordurosa
- Hepatite do Diabético
- Esteatonecrose não alcoólica
- Hepatite *alcohol-like*

TERMINOLOGIA "Nonalcoholic steatohepatitis NASH"

LUDWIG et al., 1980

- 20 mulheres com ingestão alcoólica insignificante
- Síndrome caracterizada pela associação de **ESTEATOSE E HEPATITE LOBULAR (PARENQUIMATOSA)**
- Presença de obesidade moderada / diabetes mellitus
- Elevações leves de transaminases e hepatomegalia
- Presença de fibrose na maioria dos casos e cirrose em alguns

Doença Hepática Gordurosa Não Alcoólica (NAFLD)

Matteoni et al, 1999

Doença Hepática Gordurosa Não Alcoólica

EPIDEMIOLOGIA

- Prevalência na população geral

~ 2-3% para NASH

~ 20% para esteatose

- Cada vez mais casos tem sido diagnosticados em diferentes populações e em diferentes situações.
- No DM2 não é bem definida : ~70-75%

CONDIÇÕES ASSOCIADAS

Condições Metabólicas Adquiridas

- obesidade
- diabetes mellitus
- dislipidemias
- síndrome metabólica
- nutrição parenteral total
- perda de peso rápida

Erros Inatos do Metabolismo

- doença de Wilson
- abetalipoproteinemia
- tirosinemia
- hipobetalipoproteinemia

Procedimentos Cirúrgicos

- bypass jejunoileal
- derivação biliopancreática
- ressecção maciça do intestino delgado

Drogas/Toxinas

- amiodarona
- glicocorticóides
- estrógenos sintéticos
- tamoxifeno
- isoniazida
- exposição a produtos petroquímicos

Outras

- lipodistrofias
- diverticulose jejunal com hiperproliferação bacteriana

SINDROME METABÓLICA

RESISTÊNCIA INSULÍNICA

NAFLD

Marchesini et al, 2001
Diabetes 50:1844-1850.

Cortez-Pinto et al
Clin Nutr. 1999 Dec;18(6):353-8.

RESISTÊNCIA INSULÍNICA x NASH

- **MARCHESINI et al. (1999)** estudaram 46 pacientes com aumento de transaminases, esteatose à US e tolerância à glicose normais.

Demonstraram que resistência insulínica, hipertrigliceridemia, hiperinsulinemia estavam associadas à NASH, independentemente de peso corpóreo, o IMC, o padrão de distribuição de gordura e a tolerância à glicose.

- **COMERT et al. (2001)** demonstraram hiperinsulinemia e resistência insulínica em pacientes com NASH na ausência de obesidade, diabetes ou dislipidemia.

- **CHITTURI et al. (2002)** avaliaram 66 pacientes com diagnóstico de NASH por biópsia hepática.

Observaram resistência insulínica, independente de obesidade e apresentavam quadro de Sd. Metabólica.

RESISTÊNCIA INSULÍNICA x NASH

- **MARCHESINI et al. (2001)** estudaram 30 pacientes com NAFLD diagnosticado por biópsia hepática, não obesos e c/ tolerância a glicose normal.
 - ✓9 - esteatose pura
 - ✓21 - esteatohepatite
- 10 pacientes com DM2 bem controlado / 10 controles normais

**** Clamp euglicêmico hiperinsulinêmico**

Glucose Disposal
($\mu\text{mol} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$)

Free Fatty Acid Levels
(mmol/l)

Glucose Production
($\mu\text{mol} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$)

PATOGÊNESE

Teoria "Two-Hit"

Predisposição

Hit 1: obesidade, DM,...

ESTEATOSE

Hit 2: radicais livres

ESTEATO-HEPATITE

Doença Hepática Gordurosa Não Alcoólica

PATOGÊNESE

RESISTÊNCIA INSULÍNICA: papel central

SOBRECARGA DE FERRO: resistência insulínica ~ NASH

APRESENTAÇÃO CLÍNICA

- **CLÍNICA:**

- Assintomático
- Hepatomegalia

- **BIOQUÍMICA:**

- ALT (TGP) > AST (TGO)
- γ GT é a 2ª alteração mais descrita
- função hepática preservada (albumina, TP e bilirrubina normais)

*** AUSÊNCIA DE OUTRAS CAUSAS DE DOENÇA HEPÁTICA**

EXAMES DE IMAGEM

- **ULTRA-SONOGRAFIA:**

ESTEATOSE: hiperecogenicidade hepática (“fígado brilhante”)

Sensibilidade: 89-95% / Especificidade: 84-93%

FIBROSE: ecotextura heterogênea

Sensibilidade: 57-77% / Especificidade: 85-89%

- **TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA**

- **RESSONÂNCIA MAGNÉTICA**

c/ Espectroscopia - avaliação quantitativa

Doença Hepática Gordurosa Não Alcoólica

DIAGNÓSTICO = HISTOPATOLOGIA HEPÁTICA

Doença Hepática Gordurosa Não Alcoólica

✓ HISTOPATOLOGIA HEPÁTICA

NORMAL

ESTEATOSE

Doença Hepática Gordurosa Não Alcoólica

DIAGNÓSTICO = HISTOPATOLOGIA HEPÁTICA

Doença Hepática Gordurosa Não Alcoólica

✓ HISTOPATOLOGIA HEPÁTICA

NORMAL

NASH

Doença Hepática Gordurosa Não Alcoólica

DIAGNÓSTICO = HISTOPATOLOGIA HEPÁTICA

Doença Hepática Gordurosa Não Alcoólica

✓ HISTOPATOLOGIA HEPÁTICA

FIBROSE PERISINUSOIDAL

FIBROSE NO ESPAÇO PORTA

TRATAMENTO

1. CONTROLE DAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS

- **PERDA DE PESO:**

Lenta e gradual, de pelo menos 10% do peso

- **CONTROLE DO DM:**

Metformina

Glitazonas

- **CONTROLE DA DISLIPIDEMIA:**

Clofibrato

Genfibrozila

Atorvastatina

TRATAMENTO

2. DROGAS “HEPATOPROTETORAS”

- **ÁCIDO URSODEOIXICÓLICO (Ursacol)**
- **BETAINE (S-adenosilmetionina)**
- **N-ACETILCISTEÍNA (glutathiona)**
- **VITAMINA E**

Caracterização Bioquímica, Ultra-Sonográfica e Histológica da Esteato-Hepatite Não Alcoólica (NASH) associada à Lipodistrofia Parcial Familiar

Cyntia F.G. Viana
Renan M. Montenegro Jr.
Marcellus H.L.P. Souza
Leandra N.Z, Ramalho
Valdair F. Muglia
Jorge Elias Jr.
Sérgio Zucoloto
Ana L. C. Martinelli
Milton C. Foss

Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto

USP

DEFINIÇÃO

- **SÍNDROMES LIPODISTRÓFICAS:**
Diminuição da gordura corpórea
+
Alterações metabólicas graves
- **PARCIAL:** ↓ gordura em partes do corpo
- **FAMILIAR:** transmissão autossômica dominante
- **DESCRITA POR DUNNIGAN (1974) E KOBBERLING (1975)**
- **RARA** F ↑

Lipodistrofia Parcial Familiar

FENÓTIPO

Tipo 1

Tipo 2

- ✓ ↓ gordura em todos os membros
- ✓ Face e pescoço poupados
- ✓ Hipertrofia muscular
- ✓ Flebomegalia
- ✓ Hipotrofia mamária
- ✓ ↑ relação cintura-quadril

OBJETIVOS

- Avaliar o **comprometimento hepático (NAFLD)** em pacientes com lipodistrofia parcial familiar;
- Verificar sinais de **sobrecarga de ferro** no soro e no tecido hepático de pacientes com LPF;
- Verificar a presença de **mutações do gene HFE** em pacientes com LPF;

Sobrecarga Ferro x DM

CASUÍSTICA E MÉTODOS

Pacientes com diagnóstico clínico de LPF

3 famílias = 13 pacientes

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO

- **Ingestão alcoólica** >20g/dia, ou mal definida
- Presença de **marcadores** para outra **doença hepática** (HBsAg, anti-HCV, anti-músculo liso >1:80, anti-mitocôndria > 1:80, ceruloplamina diminuída, α_1 -antitripsina diminuída)
- Uso das **medicações**: amiodarona, corticóide, estrógenos em altas doses, metrotexate

Lipodistrofia Parcial Familiar

RELAÇÃO DE PARENTESCO

MÉTODOS

- ✓ **AVALIAÇÃO CLÍNICA** (peso, altura, IMC, sinais de hepatopatia)
- ✓ **AVALIAÇÃO BIOQUÍMICA** (metabólica, enzimas e provas de função hepática e avaliação de sobrecarga de ferro)
- ✓ **ULTRA-SONOGRAFIA HEPÁTICA**
- ✓ **AVALIAÇÃO HISTOPATOLÓGICA DO FÍGADO** (biópsia hepática percutânea guiada por US)
- ✓ **PESQUISA DE FERRO NO TECIDO HEPÁTICO**
- ✓ **DETERMINAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO GENE HFE**

Lipodistrofia Parcial Familiar

CARACTERÍSTICAS GERAIS DAS PACIENTES COM LPF

paciente	família I				família II		família III						
	LRSF	SEM	RFMA	KMA	EG	MAGS	SAP	MJPS	JiPS	JaPS	MAFB	RCBR	CIS
sexo	fem	fem	fem	fem	fem	fem	fem	fem	fem	fem	fem	fem	fem
idade (anos)	47	62	40	20	32	35	52	33	15	12	46	27	44
fenótipo	tipo 2	tipo 2	tipo 2	tipo 2	tipo 1	tipo 1	tipo 2	tipo 2	tipo 2	tipo 2	tipo 2	tipo 2	tipo 2
IMC (Kg/m ²)	23	21	28,7	21,6	25	26	25	24	18,5	23	22,4	26,3	30,8
HAS	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	Sim	Sim	Não

Lipodistrofia Parcial Familiar

CARACTERÍSTICAS METABÓLICAS DAS PACIENTES COM LPF

paciente	família I				família II		família III						
	LRSF	SEM	RFMA	KMA	EG	MAGS	SAP	MJPS	JiPS	JaPS	MAFB	RCBR	CIS
colesterol (mg/dl)	329	194	240	262	444	178	172	223	215	192	148	130	167
HDL (mg/dl)	43	21,6	25	20,7	20	30	44	44	21	22	36	42	40
triglicérides (mg/dl)	600	319	387	228	1210	235	124	364	269	194	110	65	138
TOTG-75 (mg/dl)	zero	170	63	57	118	111	-	85	64	69	77	104	82
	30 min	209	113	79	211,6	172	-	133	95	97	156	126	150
	60 min	254	166	98	223	223	-	142	91	86	151	163	155
	90 min	297	167	104	176	181	-	144	92	90	177	201	160
	120 min	295	169	104	147	233	-	157	80	85	132	230	147
insulina basal (μ U/ml)	16	31,2	43,7	30	23,1	55,4	35,7	37	18	21	4	2,8	10
insulina pico (μ U/ml)	28	63	342,5	306	39,4	531,1	63,1	371	289	278	300	75	266

Lipodistrofia Parcial Familiar

OCORRÊNCIA DE ALTERAÇÕES ULTRA-SONOGRÁFICAS NA LPF

Lipodistrofia Parcial Familiar

OCORRÊNCIA DE ALTERAÇÕES DE HISTOPATOLGIA HEPÁTICA NA LPF

CONCLUSÕES

- ✓ Todas as 11 pacientes biopsiadas (100%) apresentavam comprometimento hepático.
- ✓ A NASH foi a principal responsável pelo comprometimento hepático na LPF, sendo diagnosticada em 61,5% dos casos, sendo que todas as demais apresentavam inflamação e fibrose.
- ✓ Não foi observada relação de sobrecarga de ferro ou mutações no gene HFE com doença hepática na LPF.